# От гипертанизаской болевни.

#### Лакарственный сбор ЖІ

I. Вереза белая, лист	IOr.
2. Роза белая, лепестки	Ior.
3. Дониик, лекарственная трава	for.
4. Мордовник обыкновенный, трава	10r.
5. Солодка голая, корень	lor:
6. Липа сердцевидная, цветки	20r.
7. Малина обыкновенная, плодн	sor.
8. Душица обыкновенная, трава	sor.
9. Мать-и-мачеха, лист	20r.
10.Подорожник большой, лист	gor.
II.Хвощ полевой, побеги	30r.
12. Буквица лекарственная, трава	30r.
13.Укроп огородний, трава и семена	sor.
14.Ание ,плоды	30r.
15.Мелисса лек.	30r.
16.Пустырник пятилопостный, трава	30r.
17.Боярышник кровяно-красный,	40r.
пветки, плоды 18. Енповили, плоди/истойочь/	506
19. Бассмертник песчаный, трава	bor.
	60r.
20. Сущеница топяная, трава	OOF.

Столовую ложку /5-6г./указанной смеси заваривать 500мл кипятка, томить 30минут и принимать по 150мл Зраза в день за 10-15минут до едв. Последнюю дозу вечером можно нить перед сном не заедая.

# Лекарственный сбор №2.

І. Верба, кора	Sr.
2. Одуванчик лекарствонный,	10r.
Э.Полынь обыкнов., трава	IOr.
4.Тысячалистник, трава	ISP.

5г указанной смеси заваривать 50млкипятка и принимать по 50мл утром и перед обслом за 10-15минут до приема основного настоя. Горечи принимать необходимо с перерывами, так как к ним бывает привыкание при длительном употребления. Применяется особонно в осение-весений период. Лекерственине настои, кроме горечей можно принимать длительное время, делая небольшие, в 5-10 дней, перерыви черев год.

#### **АТПРОСИЛЕРОЗ**

Реномендуются плоды обленики, черноплодной рабины, черники, послена

черного и компоты из абрикосов с косточками.

На этом фоне в начале курса лечения назначали настой кория валериани из расчета 3-4г толченого кория на 250мл кипятка, настаивать в течение 2 часов /не кипятить/, принимать по 75мл Зрава в день, последною
дозу — перед сном в горячем виде с медом. При вялости кишечника утром
за полчаса до еди принимать половину чайной ложки ламинари сахаристой
/морской капусты/, запивать 100мл холодной воды.

При головокружения в экстросисталах при нормальном артериальном

давлении рекомендовали настой на следующих растений:

#### Coop MO.

I. Рута душистая, трава	br.
2. Вудра плющевидная, трава	5r.
З. Земляника лесияя, плоды	10r.
в. Келисса, лек.	5r.
5. хвод полевой, побеги	for.
6. Зверобой продырявленный, трава	IOr.
7. Мать-имечеха, лист	10r.
8. Роза белея, лепестки	20r.
9. Чабрен, трава	20r.
10.Укроп, семена	gor.
11.Сушеница лесная, трана	30r.
13. Пустырник пятилопостимЕ, трава	50r.

Заваривать по 5-6г смеси на 500мл кипятка, томить 30минут и п принимать по 150мл Зраза в день за 10-15минут до еды.

Если у больного с выраженным атеросклерозом и нормальным давлением имеются головные боли и шум в ушах, рекомендется соцветия илевера дугового с листочками, настоениве в течение 10суток на 40 алкаголе /20г на 500мл/. Принимать по 20мл один раз в сутки перед обедом или перед сном.

Такое лечение мы проводили в течение месяца. Если положитель-

лекарствениях растений.

12. Хвод полевой, побеги

#### Coop #4.

I. Вереза белая, почки	Sr.	13. Налфей дек., трава-30г.
2. Береза белая, лист	ior.	14. Сущеница лесная,
В. Роза белая, лепестки	Tor.	трава -30г.
4. Донник лек., трава	IOr.	15. Буквица лек., травазог.
5. Мордовник обыкнов., плоды	IOr.	трана с семенами ЗОГ.
в. Солодка голая, корейь	ior.	трава с семенами 30г.
7. Лен жемянияйх посевной, семена	gor.	18. Шиповник, плоды,
3. Малина обыкновенная, плоды 0. Душица обыкновенная, трава	20r.	/нетолочь/ 50г.
10.Marb-u-wayexa, ANCT	gor.	19. Весмертник песча-
11.Подорожник больной лист	gor.	ный, трава 30r.

30r.

Столовую ложку /5-6г/указанной смеси заваривать 500мл кипятка, томить 30млнут и принимать по 150мл Зраза в день за 10-15минут до еди Вкус настоя приятный, запах ароматический. Последнюю вечернюю дозу можно пить перед сном не заедая.

Кроме того, ми рекомендуем теплые общие вании из трави душици, шалфав, берези/листьев с ветками/.Каждого ингридиента по ГОг. на 2л кинятка, парить 2часа, процедить.Лобавить достаточное колличество теплой воды в ванну, принимать от 7до Г5минут.Такие ванны оказавают успокаивающее действие, вызывают ослабление нервного напряжения, расширяют сосуды и улучнают сон. Принимать их следует 2раза в неделю.

Необходимо отметить, что при атеросклерозе, если у больных давление находится в пределах нормы, такие растения, как сушеница болотная и боярышник кровяно-ирасный, мы назначаем в уменьшеных дозах. При низких

цифрак давления эти растения и мордовник жеключаются.

Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях почек, почечных ложанок, мочевого пузыря, почечнокаменной болезки, следующие:

#### Обор №5

1. Лаванда колосовая, трава	IOr.
2.Смородина черная, лист	Tor.
В.Вереза белая, лист	IOr.
4. Булра площевидияя, трава	Ior.
5. Можевельник обыкновенный, плоды	IOr.
6. Хмель обыкновенный, шишки	IOr.
7.Роза кримская, лепестки	IOT.
в, Толокнянка обыкновенная, листья.	20r.
9. Буквица лекарственная, трава	20r.
10. Врусника, лист	gor.
11. Подорожник большой, ямет	SOr.
ТЕ. Крапива двудомная, трава	30r.
13. Еиповикк коричиевый, плоды толченые	40r
14, Земляника лесная, плоди	60r.
15. Хрош полевой, побеги	001

При острых гламерулонефритах дова хвоща уменьшается в Ер.

5-сг набора заваривать 500мл кипятка, томить 30мин, не кипятить. Принимать по 150 мл 3 раза в день за полчаез до еды теплим.

При почечнокаменной болезни добавляют следующие растения: безелика мятолистная, лепестки красной розы, ромашки аптечной по

одной части.

Принимать настой необходимо в первые дни лечения из расчета:

10г. смеси заваривают 750 мл кипятка: принимают в течении суток
в теплом виде 4-5рав, если нет противопаназений к употреблению кидкости. Необходимо помнить, что жили после кажлого мочекспускания
пужно вышить настой в количестве 150-200 млобявительно теплим
После отхождения камня дову уменьшить: 5-6г на 500мл.
Дополнительно необходимо употреблять клубничный или земляничный
сок при острых болях натащак за 10-15мин до приема мастоя трав.

Передво приходилось применять фитотеранию при остром гастрите, особенно снязанным с нишенным токсиконноскциями, и он быстро ликвидироволося после следующих мероприятию: полный покой, постельный режим, голод и употребление теплого настоя следующих лекарственных растений.

#### Лекарственный сбор №6.

1.Знеробой продирявлениий, трава	10r.
2. Репяшок обыкновенный, трава	10r.
Э.Подорожник большой, лист	20r.
4.Мята перечная, лист	20r.
5. Ромашка аптечная, цветки	20r.

5-6г. смеси указанных растений заварить 500ми кипятка, настакать в течении 30минут, принимать по 75г через каждый час. При рвоте сразу после нее принимать маленвкими глотками, теплим. В сутки можно заваривать браза в зависимости от состояния больного. Обычно растройство желудка, рвота прекрадалась после приема 3-5порций настоя. Первые дози принимать необходимо без сахара, в последующим можно добавить несольные его кол-во.

Пастой рекомендуется принимать до тех пор, пока не исчеснут все симитоми этого засолевания. Обычно все диспенсивеские симитоми пракращались на вторне, редко третьи сутки. Па эторой день поназана жидкая и полужжидкая пида, а в дальнейшем постепенное расширение дисти, которая в течевие месяца должна оставаться жадащей.

всям у больных хронический гастрит осложникся нерушенкем функции печани и желчинх путей, на рекомендуем дополнительно настои из лекарствонных растечей от заболеваний печени в порядке чередования и соответствуршую дисту.

Декарственные растения, применяемые при затанувшемся остром гастрите, кроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, следурдие:

# Лекарственный сбор 117.

/ 1. Сушеница болотная, трава	IOn.
в.Ромашка аптечная, цеетки	Tor.
Э.Роза крымская и белая, депестки	TOr.
	. 02 8
4. Календула декарственная, напремная	
yant yang yang yang yang yang yang yang yang	ICr.
5. Увощ праввой побеги	TOT.
6. Репяшок обыкнов., надземная часть	20r.
	- MA - M
7. Вожье дерево/полынь полевая/,	-
надземная часть	20r.
В. Енповник коричный, плоды толченые	por.
9.Укроп огородный, семена	30r.
10.Зверобой продырявлениый, трава	40r.
П. Подорожник большой, листья	40r.
12. Тисячелистинк обыкновенний, верхуш-	
ки цветущих растений.	70r.

бг. смеси ваварить 500мл кипятка, томить 30минут, не кипятить. Принимать 4раза в сутки по 100мл за 15-20минут до еды.

Если у больных кроническим гастритом стул-с наклонностью к поносу, указаний сбор необходимо дополнить травой зверобоя продирявленного, корой луба /по IOr./.Если емется наклонность к запору то необходимо добавлять кору крушины, александрийский лист или ревень. Надо найти оптимально-минимальную дозу, чтобы действие было не слабительное, а топизирувае, усиливабае перистальтику толстих кишок.

в толченом виде как ароматическое и улучшавшее вкус и пищеварение

желчегонное средство.

Всли боли в области желудка носят острый характер, то к данному сбору надо добавлять листья мяти перечной /iOr./ избегать передовировки. Ментол, содержащийся в эфирном масле листьев мяти, обладает местнообезбаливающий, спазмолитическим и антисептическим свойствамк.

При остром гастрите и лавенной болевии желудка и двенадцатиперстной кишки можно к данному сбору добавить семена льна/10г./, сливистие вещества которых обладают обволакивающим, противовоспалительным действием и легким слабительным, основанным на том, что слизь и масло семин льна, обволакивая сливистую оболочку желудка и кищок, образуя тонкий защитений слой, что помогает сиять воспалительные явления и болевиенные симитомы. С этой же целью можно использовать к молодые клубии итрушники патинстого.

При неврастеническом синдроме- повышенной роздражительности плохом сис, бистрой утомляемости и изменчивости настроения дополнительно рекомендуем в порядке чередовения следующие лек. рестения:

# Coop #8.

Г.Вероника лекарственная, надвемная часть	IOr.
1. Валериана лекарственная, корень	TOP.
З.Чабрец, трава	20r.
4. Пустириик, трава	20r.
Б.Екевина, цвет и лист	30r.
6. Зверобой продырявленный, трава	40r.
7. Подорожник большой, лишт	40r.
в. ізкиовник, плоды/толченне/	40r.

При сопутствующем холецистице, холангите назначелся сбор расте-

# При заболеваниях печени.

### Coop ED.

1. Календула лек., надземнея часть	ICP.
2.Укроп огородный, семена	10r.
В.Вереза белая, листья	IOr.
4. Сушеница лесная, трава	10r.
5. Можмевельник обычновенный, плоды	IOr.
6.Ромашка аптечная, цветки	gor.
7. Земляника лесная, плоды	20r.
8.Роза белая, лепестки	gor.
9. Хвощ полевой, побеги	30r.
10.Кукурувные рыльца	30r.
11. Ниповник коричний, пледы/толченые/	30r.
12.Одуванчик лек., корень	30r.
14.Вессмертник песчаний, цветки	40r.

Пастой приготовливот следурщии образом:5-6г смеси завариварт 500мл кинятка, томит и при нимерт по 150мл 3раза в сутки за 10-15минут по еди-жкускизския

Во времи приступов печенсчной колики-нестой принимать в горячем виде и добавить мяти до ТОг. При наклонности к отекам ко-во кинятка можно сократить до 250мл. Утром за Т5ммнут до приема настоя полеано принять тертую морковь с небольшим количеством сметаны или пареную с медом тыкву.